T/GXAS

团 体

标

T/GXAS 038-2019

宁明八角香鸡养殖技术规程

Technical regulations for cultivation of Ningming star anise xiang chicken

2019 - 12 - 16 发布

2019 - 12 - 20 实施

广西标准化协会

发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁明县市场监督管理局提出。

本标准起草单位:宁明县市场监督管理局、广西派阳林下产业开发有限责任公司、宁明县农业农村局、广西标准化协会。

本标准主要起草人: 刘雨涛、李海荣、黄钰铭、赵剑笔、邹宏、刘祁云、莫耀林。

宁明八角香鸡养殖技术规程

1 范围

本标准规定了八角香鸡的术语和定义、鸡场选址、鸡舍建筑与设备、饲养管理、疾病防控与免疫、 售前检验。

本标准适用于宁明八角香鸡养殖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

NY 5030 无公害农产品/兽药使用准则

NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

NY/T 5339 无公害农产品 畜禽防疫准则

DB45<mark>/T</mark> 1000 林下养鸡技<mark>术</mark>规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

宁明八角香鸡 star anise xiang chicken

选用地方优质肉鸡品种,在宁明八角林养殖的,具有皮薄、肉嫩、骨细和八角幽香特点的商品肉鸡。

4 鸡场选址

符合当地畜牧业发展规划的要求,向阳通风,平坦或稍有坡度的成龄八角林区山地;水质良好,水源充足,符合NY 5027的要求,环境空气质量符合GB 3095的要求,海拔在300 m~1 000 m的成龄八角林区。

5 鸡舍建筑与设备

5.1 鸡舍要求

- 5.1.1 半开放式或全开放式,坐北朝南,冬暖夏凉。四周不建墙壁,用立柱(水泥柱或杉木)支撑,屋顶用石棉瓦、屋架用杂木。
- 5.1.2 跨度 7.5 m~8.0 m, 屋檐高度 2.2 m~2.5 m, 四周用彩条布做卷帘。

T/GXAS 038-2019

5.2 围栏

根据林地面积以及鸡只数量,用铁丝网、竹条、木条、尼龙网等材料围成高度为1.8 m~2.0 m的围栏,以鸡只不能跳出或飞出为宜。

5.3 设备

每50~60只鸡配备与鸡龄大小相配套的1个饮水器或水盆、1个料盘或料桶或食槽。

6 饲养管理

6.1 雏鸡要求

选择有资质的广西本地优质肉鸡种。

6.2 育雏期的饲养管理

6.2.1 育雏方式

采用地面平养方式育雏,可用刨花做垫料,保温可用红外线灯或煤炉或地热,鸡舍地板及垫料要保持干燥。

6.2.2 环境条件

进苗后1 d~2 d,温度控制在33 ℃~35 ℃,按0.5 ℃/d的速度下降至室温,6周后保持在20 ℃~24 ℃;湿度控制60%~70%;光照1~3日龄保持24 h,4~14日龄保持18 h,15日龄降到14 h。

6.2.3 饲养密度

1周龄40羽/m², 2周龄30羽/m², 3周龄25羽/m², 5 \sim 6周龄 $15\sim20$ 羽/m²。

6.2.4 饮水和开食

出壳24 h给予饮水,水温在20 $\mathbb{C} \sim 25 \mathbb{C}$ 为宜,饮水2 h \sim 3 h后喂全价小鸡饲料,育雏期自由采食。

6.2.5 断喙

7d~10d进行断喙。

6.2.6 阉割

小公鸡24~26 日龄,阉割前,检查鸡的健康状况,非健康的公鸡不能阉割;阉割前后,在饲料和饮水中加入维生素K3、多维、阿莫西林等药物。

6.3 放养期的饲养管理

6.3.1 放养日龄

5~6周龄以后,根据天气情况进行放养。

6.3.2 过渡期饲喂

早上喂半饱,让鸡群到八角林下觅食青草、野菜、昆虫、八角籽粒等野生饲料资源;傍晚,可根据鸡群的饥饱程度补饲,玉米、稻谷等粒状料可直接在八角林下的空地上撒喂,混合料、糠麸等粉状料放到料盆中干喂或湿喂。其他可参照DB45/T 1000操作。

6.3.3 训练和调教

6.3.3.1 放养初期调教

选择天气暖和的晴天放养,开始宜每天放养2 h~4 h,后逐步增加放养时间;放养地点最初选在鸡舍周围进行,逐渐由近到远,可通过移动料桶,料槽的方法训练。

6.3.3.2 放养调教

从放养第一天开始进行舍外放养运动的调教。由两人配合,早上,1人在前面吹哨,另一人在后面 赶鸡,使鸡群形成条件反射,进入八角林活动。傍晚,在鸡舍旁边喂料,把鸡群引回鸡舍。

6.4 饲养期

童鸡40 d~100 d, 项鸡≥180 d, 阉鸡≥240 d。

7 疾病防控与免疫

7.1 消毒

- 7.1.1 对鸡舍定期消毒,可采用卫生消毒、物理消毒和化学消毒等方式,清洁与消毒及各项兽医防疫应符合 NY/T 5339 的规定。
- 7.1.2 育雏鸡舍接鸡前应对鸡舍进行彻底清扫并做好消毒工作。
- 7.1.3 定期对鸡舍带鸡以及周边环境进行喷雾消毒,喷雾选择有效的消毒药。

7.2 预防性给药

根据疾病发病<mark>期</mark>规律,调整鸡只密度。可在饲料、饮水中添加预防兽药。兽药使用应符合NY 5030的规定。

7.3 发病给药

受到疫病威胁或群体已发病期,每日可进行2~3次消毒。并依据疫病情况,饲喂鸡只药物。

7.4 免疫

根据当地疫病发生情况和特点,做好马立克氏病、高致病性禽流感、鸡新城疫、鸡传染性法氏囊等 传染病的免疫接种工作。免疫接种可参照以下程序:

- a) 1日龄: 预防马立克氏病, 出壳24 h内接种马立克病疫苗, 每只颈部皮下注射0.2 mL;
- b) 5~7日龄: 预防新城疫、传染性支气管炎,用单联或二联弱毒苗滴鼻或滴眼;
- c) 10~14日龄:预防新城疫、传染性支气管炎、禽流感、鸡痘、传染性法氏囊病;
- d) 25~35日龄:接种传染性法氏囊病疫苗、禽流感疫苗;
- e) 40~45日龄:分别注射新城疫、禽流感(H₅—H₇)的单联苗或二联灭活油苗;
- f) 50~100日龄:注射鸡新城疫疫苗;

T/GXAS 038—2019

g) 120日龄以上:注射禽流感疫苗。

8 售前检验

出售前按国家有关规定进行产地检疫,检疫合格方可上市;检疫不合格,不得上市且按国家有关规 定进行无害化处理。

中华人民共和国团体标准 宁明八角香鸡养殖技术规程 T/GXAS 038—2019 广西标准化协会统一印制 版权专有 侵权必究

团 体 标 准 公 告

2022年第40号(总第98号)

关于批准发布 T/GXAS 038—2019《宁明八角香鸡养殖技术规程》团体标准第 1 号修改单的公告

广西标准化协会批准 T/GXAS 038—2019《宁明八角香鸡养殖技术规程》团体标准第 1 号修改单,自 2022 年 10 月 7 日起实施,现予以公布(见附件)。

附件: T/GXAS 038-2019《宁明八角香鸡养殖技术规程》 第1号修改单



附件

T/GXAS 038—2019《宁明八角香鸡养殖技术规程》 第1号修改单

规范性引用文件中增加《NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质》。