

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
7	本文件主要起草人	秦崧淋、10、邓振旺、唐燕、翟勇进、阳天喜、葛玉珍(15)	删除“10”“(15)”	桂林市石山绿化试验站	采纳
8	前言、主要起草人	何彦兴、秦崧淋、10、邓振旺、唐燕、	“10”字要么是人名要么删除	桂林园林植物园	采纳
9	1	轻基质育苗的育苗容器	轻基质育苗容器	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
10	1	适用于以桂林……育苗生产	删除“以”，育苗改成“苗木”	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
11	1	山苍子(第一处)	山苍子 (Litsea cubeba (Lour.) Pers.)	桂林市临桂区林业局	部分采纳
12	1	…定义，规定了…	…定义了山苍子轻基质容器育苗技术的程序，规定了…	桂林市临桂区林业局	准信标准文件编写简明扼要原则，不采纳
13	1	…适用于以桂林行政区域内山苍子 …	…适用于山苍子.	桂林市临桂区林业局	部分采纳
14	1	本文件适用于以桂林行政区域内山苍子轻基质容器育苗生产	本文件适用于桂林行政区域内山苍子轻基质容器育苗生产	桂林园林植物园	采纳
15	1	本文件界定了山苍子轻基质容器育苗涉及的术语和定义	在中文名后面增加拉丁名“Litsea cubeba”	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
16	1	本文件适用于以桂林行政区域内山苍子轻基质容器育苗生产。	删除“以”字	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
17	2	6 项国标；6 项行标	建议删除文件中没有具体引用的标准	桂林市临桂区林业局	采纳
18	2	规范性引用文件国际行标的引用	同一层级标准按时间顺序排列、字体不统一	桂林市石山绿化试验站	采纳
19	3.1	light substrate	Light substrate	桂林市临桂区林业局	采纳
20	3	术语和定义英文	英文表述要核实	桂林市石山绿化试验站	采纳
21	4.1	可降解网袋规格 8cm×14cm	8 与 cm 之间增加空格	桂林市石山绿化试验站	采纳
22	4.2.1	pH 值 6.0~6.5。调高 pH 值用生石灰或草木灰，降低 pH 值用硫磺粉	pH6.0~6.5。调高 pH 用生石灰或草木灰，降低 pH 用硫磺粉	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
23	4.2.1	基质配比	pH 值、pH 值写法要规范	桂林市虞山公园管理处	采纳
24	4.2.1	宜添加 2.0kg/m ³ 的缓释复合肥	宜添加 2.0kg/m ³ 的缓释复合肥 (N:P ₂ O ₅ :K ₂ O=??:?)	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
25	4.2	4.2.1 基质配比；酸碱度调节； 4.2.2 基质消毒	建议提供几种配比方法、消毒方式，并以附录表格体现	桂林市临桂区林业局	部分采纳
26	4.2.2	基质消毒“堆积后用农膜覆盖 3d~4d”	全文统一对时间的表述	桂林市石山绿化试验站	采纳
27	4.2.2	……喷洒复混基质，堆积后 ……	增加搅拌均匀	桂林市石山绿化试验站	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
28	4.2.2	按体积比用 70%可湿性甲基托布津 800 倍液等喷洒复混基质	删除“按体积比”和“等”，表述为：用 70%可湿性甲基托布津粉剂 800 倍液喷洒复混基质	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
29	增加 4.2.3 容器消毒		4.2.3 容器消毒将育苗容器放入浓度为 0.1%~0.3% 高锰酸钾 (KMnO ₄) 溶液中浸泡 10~20 min, 清水冲净晾干备用。	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
30	5.1	树干通直的植株为采种母树	果实致密成串的植株为采种母树	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
31	5	5.1~5.5;6.3 等条	建议删除采集内容；合并 6.3 条	桂林市临桂区林业综合发展中心	参照 LY/T 2942-2018 山苍子苗木培育技术规程相关描述，在内容上与现行法律法规、标准协调一致，故不采纳
32	5.2	8 月上旬	8 月下旬	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
33	5.3	种子加工	果实处理	桂林市林业和园林综合服务中心	参照 LY/T 2942-2018 山苍子苗木培育技术规程相关描述，在内容上与现行法律法规、标准协调一致，故不采纳。
34	5.3	按照 LY/T2942-2018 规定执行	建议删除引用标准的年号，需同步修改全文同类问题	桂林市石山绿化试验站	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
35	5.5	在温室大棚里，常温条件下沙藏	在温室大棚里沙藏	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
36	5.5	种子沙藏	是否要说明沙藏的最宜时长、温度 and 层数等	桂林市虞山公园管理处	部分采纳
37	5.5	……沙藏前在床底铺 10cm 的中粒河沙……覆盖 8cm 中粒河沙	10 cm 厚的中粒河沙……覆盖 8cm 厚中粒河沙	桂林市石山绿化试验站	采纳
38	6.1	将装好基质的容器成列成行摆放	将装好基质的容器摆放成畦，畦宽 1.2m……每畦间规划宽 40cm 步道	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
39	6.1	…排水良好。将装好基质的 …	…排水良好。（删除）或另列	桂林市临桂区林业局	采纳
40	6.2	按照 LY/T 2541-2015 执行。	建议核对是否需要	桂林市临桂区林业综合发展中心	采纳
41	6.3	每 12 小时换水	每 12h 换水	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
42	6.3	温度稳定在 15℃ 以上	明确是最低温度还是平均温度稳定在 15℃ 以上	桂林市石山绿化试验站	采纳
43	6.3	……用甲基托布津 8 0 0 倍液浸种消毒 ……	……用 70% 可湿性甲基托布津粉剂 800 倍液 ……	桂林市石山绿化试验站	采纳
44	6.4	用用砖垒沙床播种量 2kg/667m ² ~3kg/m ²	用砖垒沙床播种量 0.3kg/m ² ~0.5kg/m ²	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
45	6.4	播种	建议除河沙外增加其它基质	桂林市石山绿化试验站	待专家审定

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
46	6.4	……用砖垒沙床 进行播种 ……	……用砖垒沙床进行播种 ……	桂林市石山绿化试验站	采纳
47	6.4	播种量 $2\text{kg}/667\text{m}^2 \sim 3\text{kg}/\text{m}^2$	$2\text{kg} \sim 3\text{kg}/667\text{m}^2$	桂林市石山绿化试验站	采纳
48	6.4	……播后淋透 70%可湿性甲基托布津 粉剂 800 倍液	种子、土壤分别消毒是否重复？	桂林市石山绿化试验站	采纳
49	6.4	……播种后覆中粒沙 3cm ……	播种后覆 3 cm 厚中粒沙	桂林市石山绿化试验站	采纳
50	6.4	播种	检查用语用词	桂林市虞山公园管理处	采纳
51	6.4	“用砖垒沙床进行播种，”	“用砖垒沙床进行播种，”	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
52	6.4	播种量 $2\text{kg}/667\text{m}^2 \sim 3\text{kg}/\text{m}^2$	建议统一换算为每平方米的播种量	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
53	6.5	有顶压的幼苗深度宜在根颈 0.5cm~1.0cm	有顶芽的幼苗深度宜在根颈之上 0.5cm~1.0cm	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
54	6.5	有顶压的幼苗 ……	有顶芽的幼苗 ……	桂林市石山绿化试验站	部分采纳
55	6.5	有顶压的幼苗	有顶芽的幼苗	桂林园林植物园	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
56	6.5	应选无病虫害、有顶压的幼苗	应选无病虫害、有顶芽的幼苗	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
57	7.1	早晚各浇一次水	上午 10 时前, 下午 16 时后, 高温夏季 17 时后各浇一次水 水	桂林市石山绿化试验站	采纳
58	7.1	水分管理	11 月后浇水适时适量应注明时间段	桂林市虞山公园管理处	采纳
59	7.3	N:P:K=25:10:16	N:P:K=25:10:16	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
60	7.3	肥料管理(N:P:K=25:10:16)	;改为:	桂林市虞山公园管理处	采纳
61	7.3	叶面喷施 0.3% ~ 0.5% 的复合肥 (N:P:K=25:10:16)水溶液	叶面喷施 0.3%~0.5%的复合肥 (N:P:K=25:10:16)	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
62	7.5	园艺防治间隔 15~20 天每隔 35~45 天	物理防治间隔. 15~20d 每隔 35~45d	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
63	7.5	7.5 病虫害防治	7.5 主要病虫害防治	桂林市临桂区林业综合发展中心	采纳
64	7.5	7.5.1~7.5.2 两条	建议合并, 分病虫害类型、种类、防治措施等, 以附录表格体现	桂林市临桂区林业综合发展中心	待专家审定
65	7.5.1	幼苗移植前, 宜用枯草芽孢杆菌(3 亿/克可湿性粉剂)0.5g/L 拌土预防.....	调整并入 6.5	桂林市石山绿化试验站	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
66	7.5.1	间隔 15~20 天喷施一次	全文对“天”的表述不统一，应统一为 d	桂林市石山绿化试验站	采纳
67	7.5	病虫害防治	核实在 7.5 和 7.5.1 之间的文字是否符合规范	桂林市虞山公园管理处	采纳
68	7.5	主要病虫害有软腐病、蚧壳虫、卷叶虫、红蜘蛛等。	删除	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
69	7.5.1 及其他地方	宜用枯草芽孢杆菌 (3 亿/克可湿性粉剂)0.5g/L 拌土预防。	克、g 等单位要统一	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
70	7.5.2	蚧壳虫的防治方法——宜用 3%呋虫胺可溶性剂 1000 倍液每隔 35~45 天喷洒一次	喷洒间隔是否过长?建议 15~20 d 喷洒一次	桂林市石山绿化试验站	采纳
71	7.6	去除遮荫网	去除遮荫网	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
72	7.6.3	7.6.3..进行炼苗,...	7.6.出圃前...进行炼苗,...	桂林市临桂区林业综合发展中心	按操作步骤顺序排列,不采纳
73	7.6.3	出圃前,提前四周进行炼苗	四周还是 4 周要全文统一	桂林市虞山公园管理处	采纳
74	7.6.3	出圃前	此节并入 8.4	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
75	8.1	部分内容有遗漏	补充轻基质、容器的质量描述	桂林市临桂区林业综合发展中心	部分采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
76	8.2	...两个等级，详见表1。苗木分级方法按照GB 6000执行。	苗木分级方法按照GB 6000执行。	桂林市临桂区林业局	采纳
77	8.2		建议苗木质量指标增加“冠幅”项	桂林园林植物园	参照LY/T 2942-2018 山苍子苗木培育技术规程苗木质量描述，在内容与现行法律法规、标准协调一致，故不采纳
78	8.2	表1	建议放附录	中国林业科学研究院热带林业实验中心	待专家审定
79	8.3	按照GB 6000规定执行。	核对是否包含苗木场地检疫、苗木标签与苗木合格证的签发，若无则需补充完善	桂林市临桂区林业综合发展中心	参照LY/T 2942-2018 山苍子苗木培育技术规程苗木检验描述，在内容与现行法律法规、标准协调一致，故不采纳
80	8.4	次年1月至4月春季萌发新芽前均可出圃	次年1月至4月均可出圃	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳
81	8.4	出圃时间	改为：苗木出圃，内容为：1月至4月春季萌发新芽前均可出圃；出圃前，提前4w进行炼苗，去除遮荫网，减少浇水次数；出圃前1d~2d浇透水。	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
82	8.5	保持容器内跟团完整	保持容器内根团完整	桂林市林业和园林综合服务中心	采纳

序号	章、条编号	原稿内容（概要）	修改意见	提出单位	处理意见
83	8.5	…出圃前 1d~2d 浇透水。	建议删除出圃前 1d~2d 浇透水	桂林市临桂区林业综合发展中心	采纳
84	8.5	装苗时要注意保持容器内跟团完整	装苗时要注意保持容器内根团完整	桂林园林植物园	采纳
85	8.5	出圃前 1d~2d 浇透水	并入 8.4	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳
86	全文	对时间表述不统一	统一规范表述	桂林市石山绿化试验站	采纳
87	全文	对时间的描述不统一	用标准形式描述	中国林业科学研究院热带林业实验中心	采纳

注：共征求七家单位专家意见，反馈收集到 87 条修改意见，采纳 72 条，部分采纳 7 条，不采纳 5 条，待专家审定 3 条。