

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS XXXX—XXXX

环江香猪饲养管理技术规范

Technical specification for feeding and management of Huanjiang -pig

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 猪场建设 1

5 饲养管理 1

6 疫病防控 3

7 记录及档案管理 3

附录 A（资料性） 香猪不同生长阶段所需栏舍面积 4

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由环江毛南族自治县畜牧站提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：环江毛南族自治县畜牧站、广西毛苗瑶食品有限公司、环江绿源生态养殖有限责任公司、广西环江香宝食品有限公司。

本文件主要起草人：覃水平、谭宋帅、韦必群、蒙佳冠、黎贞霞、韦晟纯、韦翔、张效河、覃佩高、韦恩、欧鹏、卢立正。

环江香猪饲养管理技术规范

1 范围

本文件规定了环江香猪饲养管理技术的猪场建设、饲养管理、疫病防控、记录及档案管理的要求。本文件适用于环江香猪饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准
NY / T 3445 畜禽养殖场档案规范
DB45/T 2825 地理标志产品 环江香猪
T/GXAS XXX 环江香猪

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 猪场建设

4.1 场址选择和布局

按 NY/T1568 的规定执行。

4.2 建筑要求

遵循香猪生长习性、有利生产的原则。猪舍建筑宜采用半敞开式或有窗封闭式，通风良好，采光条件充足，内墙面平整光滑，按香猪不同生长阶段准备所需的栏舍面积见表 A. 1。

4.3 设施设备

4.3.1 生产设施和设备

包括猪舍、饲料加工与储料间、装卸台，圈舍内安装饮水、饲喂、通风、降温、保暖设备。

4.3.2 辅助设施

生产区入口设置车辆消毒池、人员更衣室和消毒室。配套兽医室、隔离猪舍、无害化和粪污资源化处理设施。

5 饲养管理

5.1 种公猪

5.1.1 饲喂管理

饲料精粗比达到1：1，适当补充鸡蛋及微量元素，每日饲喂2次。

5.1.2 配种利用

公猪应符合T/GXAS XXX 环江香猪的繁殖性能后进行配种，12月龄以上的成年种公猪建议配种频率为每周3~4次，12月龄以下的种公猪为每周1~3次，使用年限4~5年。人工授精时，先对种公猪进行采精调教，成功后根据精子密度和活力调整采精频率。

5.2 空怀母猪

5.2.1 饲喂管理

饲料精粗比达到1:1，每日饲喂2次。

5.2.2 繁殖利用

母猪应符合T/GXAS XXX 环江香猪的繁殖性能后进行繁殖利用。种母猪利用6胎~10胎。每天早晚观察母猪的发情状况，发情后24 h~36 h配种，配种后21 d~28 d检查母猪是否妊娠。

5.3 妊娠母猪

5.3.1 妊娠40 d以内饲料精粗比达到1:1，每日饲喂2次。

5.3.2 产前一周精料饲喂量减少10%~20%，青粗饲料日饲喂量1.0 kg/头~1.5 kg/头。

5.3.3 妊娠期间保持圈舍安静，保持合理的休息和运动。

5.3.4 每天观察母猪采食、饮水和粪便等情况和精神状况，产前3 d~5 d转至分娩舍。

5.4 哺乳母猪

5.4.1 围产期管理

5.4.1.1 分娩前一周做好产房的清洗、消毒以及接产准备工作；临产前对母猪腹部、乳房及阴户进行消毒，然后清洗擦干。

5.4.1.2 分娩时做好接产工作，产后及时清点母猪胎衣排出数量并处理，如出现胎衣不下或排出不全，立即按使用说明注射缩宫素。如出现难产，则对母猪实施助产及治疗。

5.4.2 饲喂管理

自由饮水。分娩前开始减料，分娩后精料日饲喂量逐渐增加，每天饲喂3次。

5.5 哺乳仔猪

5.5.1 护理

出生后及时擦干口鼻和全身黏液，并进行断脐，断端用碘酊消毒。2 h内吃足初乳，对体质弱的仔猪进行人工辅助哺乳，3日龄内根据体质强弱固定乳头。3日龄~4日龄肌肉注射铁剂150 mg/头~200 mg/头，7日龄~15日龄开始补料。

5.5.2 管理

仔猪做好防寒保温，1日龄~3日龄适宜温度30℃~32℃，4日龄~14日龄适宜温度28℃~30℃，15日龄~42日龄适宜温度22℃~25℃。30 d断奶，断奶后7 d转入保育舍。

5.6 断奶仔猪

5.6.1 饲喂管理

5.6.1.1 断奶后7 d内在原圈饲养，饲喂哺乳期饲料，在饮水中添加电解质或葡萄糖。

5.6.1.2 断奶后第8 d~14 d逐步过渡至断奶仔猪料，每天饲喂3次~4次，日饲喂量(以干物质计算)0.4 kg/头~1.0 kg/头。

5.6.1.3 青粗饲料宜自由采食。

5.6.1.4 断奶1周后，按体重进行分群，转入保育舍。

5.6.1.5 调教猪的定位采食、卧息和排泄习惯。

5.7 育肥猪

5.7.1 育肥猪应符合T/GXAS XXX 环江香猪的育肥性能后进行育肥。

5.7.2 每天饲喂 2 次~3 次，饲料以青粗饲料为主，精料为辅，主要有玉米、豆粕、米糠、浓缩料、红薯藤、牧草、菜叶、红薯、木薯及微量元素、维生素等，不应使用霉变、劣质饲料。

注：各阶段猪的饲料组成及喂量视实际情况调整。

5.7.3 调教育肥猪的定位采食、卧息和排泄习惯。

5.7.4 体重达到 50 kg 以上出栏。

6 疫病防控

6.1 按照国家和地方兽医主管部门的规定，实施强制免疫计划。

6.2 建立免疫档案，详细记录免疫时间、疫苗种类、生产厂家等信息。

6.3 兽药使用应符合执行休药期规定。

6.4 发现疫情应及时隔离、报告，并采取无害化处理措施。

7 记录及档案管理

7.1 养殖场应建立完整的养殖档案，包括引种、饲料、免疫、用药、死亡、销售等信息。

7.2 档案保存应不少于 2 年。

7.3 档案管理应符合 NY / T 3445 的规定，确保真实、完整、可追溯。

附 录 A
(资料性)
香猪不同生长阶段所需栏舍面积

香猪不同生长阶段所需栏舍面积见表A. 1。

表 A. 1 香猪不同生长阶段所需栏舍面积

猪只类别	推荐饲养面积	备注
种公猪	6 m ² ~8 m ² /头	每栏 1 头为宜
空怀母猪	4 m ² ~5 m ² /头	每栏 3~5 头为宜
妊娠母猪	6 m ² ~12 m ² /头	每栏 1~2 头为宜，妊娠后期宜单栏饲养
哺乳母猪	4 m ² ~5 m ² /头	每栏 1 头为宜
断奶仔猪	0. 45 m ² ~0. 80 m ² /头	每栏 8~12 头为宜
育肥猪	1 m ² ~1. 5 m ² /头	每栏 5~6 头为宜