

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1446—2026

右江鹅

Youjiang goose

2026-09-23 发布

2026-09-29 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种分布及特性 1

 4.1 品种分布 1

5 体型外貌 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 颞苞和咽袋 1

 5.4 喙、虹彩和皮肤 1

 5.5 胫、蹼和爪 1

6 生产性能 2

 6.1 体尺和体重 2

 6.2 生长发育性能 2

 6.3 屠宰性能 2

 6.4 蛋品质 2

 表 4 43 周蛋品质（续） 3

 6.5 繁殖性能 3

 6.6 生活力 3

 6.7 饲养和繁殖方式 3

7 测定方法 3

附录 A（资料性） 右江鹅活鹅体型外貌 4

参考文献 6

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西壮族自治区畜禽品种改良站、百色市农牧渔技术推广中心、广西畜牧业协会。

本文件主要起草人：杨秀荣、杨祝良、罗锦堂、姜涛、黄富贵、黄伟灯、谢桂萍、曾铮、余慧芳、徐文文、曾令湖、蒋世强、李现超、李敏玲、刘雍翠、王卓标、袁虹、雷晓薇、冯荣华。

右江鹅

1 范围

本文件规定了右江鹅的品种分布及特性、体型外貌和生产性能，描述了测定方法。
本文件适用于右江鹅的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

原产地为百色市右江区。中心产区为右江区及驮娘江区域；主要分布于右江区、隆林各族自治县、德保县、靖西市、凌云县和田东县等。

4.2 品种特性

属肉用型地方品种，具有性情温驯、耐粗饲、抗逆性强、合群性好，生长发育快、肉质鲜嫩等特点。

5 体型外貌

5.1 体型

体型中等，体长，躯干如船形，背宽胸广。

5.2 羽毛

头部和颈的背面羽毛呈棕色，部分个体头部皮肤和肉瘤交界处有一小圈白毛；颈两侧与下方直至胸部和腹部着生白羽。背羽灰色镶琥珀边，主翼羽前两根为白色，后八根为深灰色镶白边；尾羽浅灰色镶白边；腿羽灰色。雏鹅整体灰黄色，头顶、颈背面及背部绒毛颜色较深，颈下直至胸部和腹部绒毛为黄色，颜色较浅。见图A.1、图A.2、图A.3。

5.3 颚苞和咽袋

颚苞小而平，黑色；颌下无咽袋。

5.4 喙、虹彩和皮肤

成年鹅喙与喙豆黑色；雏鹅喙黑色、喙豆肉色；虹彩黄褐色；皮肤白色或浅黄色。

5.5 胫、蹼和爪

胫、蹼橘黄色；雏鹅胫、蹼深棕色。爪黄色或黑色。

6 生产性能

6.1 体尺和体重

成年（43周）体尺和体重见表1。

表1 成年（43）周体尺和体重

项目	公鹅	母鹅
体重（g）	4 360~5 410	3 790~4 870
体斜长（cm）	26.2~32.5	24.5~29.7
龙骨长（cm）	14.3~18.5	13.4~16.5
胸宽（cm）	9.0~10.6	8.3~10.0
胸深（cm）	10.7~12.8	9.7~11.5
髌骨宽（cm）	7.6~9.5	7.0~8.9
胫长（cm）	9.2~11.0	8.3~10.8
胫围（cm）	5.0~6.0	4.5~5.7
颈长（cm）	20.2~25.0	15.8~21.5
半潜水长（cm）	54.4~63.3	49.4~59.0

6.2 生长发育性能

生长发育性能见表2。

表2 生长发育性能

周龄	体重（g）	
	公鹅	母鹅
初生	85~112	84~111
2	430~590	380~510
4	1 360~1 650	1 290~1 560
6	2 020~2 320	1 630~2 180
8	2 750~3 990	2 490~3 490
10	3 820~4 240	3 430~4 000
12	4 330~5 100	3 730~4 610

6.3 屠宰性能

上市日龄（120 d）屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（120 d）屠宰性能

项目	公鹅	母鹅
宰前体重（g）	3 950~5 600	3 520~4 950
屠宰率（%）	86.0~93.9	86.8~94.5
半净膛率（%）	77.3~85.2	77.3~85.6
全净膛率（%）	61.7~67.9	60.0~69.8
胸肌率（%）	11.9~16.5	12.9~19.0
腿肌率（%）	13.5~18.0	13.2~18.7
腹脂率（%）	3.4~9.0	4.5~9.2

6.4 蛋品质

43周蛋品质见表4。

表4 43周蛋品质

项目	范围
平均蛋重（g）	123~139
蛋形指数	1.37~1.59

表 4 43 周蛋品质（续）

项目	范围
蛋壳强度（kg/cm ² ）	3.66~5.07
蛋壳厚度（mm）	0.27~0.33
蛋黄颜色	4.36~5.69
蛋壳颜色	白/青
哈氏单位	53~77
蛋黄比率（%）	26.6~35.1
血斑和肉斑率（%）	0

6.5 繁殖性能

繁殖性能见表5。

表5 繁殖性能

项目	范围
开产日龄（d）	271~361
开产体重（g）	4 050~4 530
年产蛋数（个）	24~40
公母配比	1: 5~1: 6
种蛋合格率（%）	≥ 95.0
受精蛋孵化率（%）	≥ 95.0
种蛋受精率（%）	≥ 88.5
健雏率（%）	≥ 95.0

6.6 生活力

生活力见表6。

表6 生活力

项目	范围
育雏期存活率（%）	≥ 91.5
育成期存活率（%）	≥ 91.0
产蛋期母鹅存活率（%）	≥ 87.5

6.7 饲养和繁殖方式

饲养和繁殖方式见表7。

表7 饲养和繁殖方式

饲养方式	配种方式	孵化方式	繁殖季节
地面平养	自然交配	人工孵化	9 月至翌年 2 月

7 测定方法


体型外貌按GB/T 27534.9的规定执行；体尺和体重、生长发育性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能和生活力的测定按NY/T 823的规定执行。

附 录 A
(资料性)
右江鹅活鹅体型外貌

右江鹅活鹅体型外貌见图A. 1、图A. 2、图A. 3。



图A. 1 右江鹅成年公鹅



图A. 2 右江鹅成年母鹅



图A. 3 右江鹅雏鹅

参 考 文 献

- [1] DB45/T 341—2006 右江鹅[S].
-

中华人民共和国团体标准

右江鹅

T/GXAS 1446—2026

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究