

团 体 标 准 公 告

2025 年第 13 号（总第 394 号）

关于批准发布 T/GXAS 570-2023《绿色食品 沃柑生产技术规程》团体标准第 1 号修改单的公告

广西标准化协会批准 T/GXAS 570-2023《绿色食品 沃柑生产技术规程》团体标准第 1 号修改单，自 2025 年 4 月 10 日起实施，现予以公布（见附件）。

附件：T/GXAS 570-2023《绿色食品 沃柑生产技术规程》
第 1 号修改单



附件

T/GXAS 570-2023《绿色食品 沃柑生产技术规程》

第1号修改单

删除“8.1.3”、“9.1”、“10.2.2.1”、“10.2.2.2”、“10.2.2.4”中“腐熟农家肥”的相关内容；删除“10.2.1.2.1”中“农家肥”的相关内容；删除附录C表C.1中“噻森铜、噻菌铜、咪鲜胺、毒死蜱、阿维菌素、联苯菊酯、阿维·螺螨酯、嘧霉胺、啶酰菌胺、抗蚜威”等防治药剂及浓度，增加“甲基硫菌灵”防治药剂及浓度。修订后表C.1如下：

表 C.1 绿色食品沃柑主要病虫害化学防治表

病虫害种类		防治药剂种类及浓度	施药方法及时间
病害	柑橘溃疡病	77%氢氧化铜可湿性粉剂400~600倍液，0.5%~0.8%波尔多液	幼果期或夏、秋梢抽发3 cm~5 cm时喷药，每7 d~10 d喷1次，连续2~3次。特别是在重病区，台风暴雨过后应立即喷药防治
	柑橘炭疽病	10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000~1500倍液，40%腈菌唑水分散粒剂4000~6000倍液等	在春、夏、秋梢的嫩梢期各喷2~3次药。谢花后1个月内每隔10 d左右喷药1次保护幼果，连续喷2~3次。有急性型病斑出现时，立即进行喷药防治
	柑橘灰霉病	25%吡唑醚菌酯乳油1500~2000倍液等，70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液等	开花前喷1~2次药预防
虫害	柑橘木虱	20%吡虫啉可湿性粉剂2000~3000倍液，20%甲氰菊酯乳油1000~2000倍液，24%螺虫乙酯悬浮剂4000~5000倍液等	秋冬季（采果后）、春芽萌动前各喷杀木虱药剂一次；各次梢期连喷2次药剂，间隔时间7 d~10 d
	柑橘红蜘蛛	24%螺螨酯悬浮剂4000~5000倍液，43%联苯肼酯悬浮剂1800~2600倍液，20%乙螨唑悬浮剂6000~8000倍液等	防治指标：虫口密度春梢、秋梢期3头/叶，夏梢期5头/叶时喷药防治。每隔7 d~10 d喷1次，连喷2~3次。开花前后（3~4月）是防治的重点时期
	柑橘锈壁虱	50%苯丁锡可湿性粉剂2000~3000倍液，500 g/L氟啶胺悬浮剂1000~2000倍液、50 g/L虱螨脲乳油1500~2500倍液等	幼果期和果实膨大期为锈壁虱防治时期，当年生春梢叶背初现铁锈色，叶或果上虫口密度每个视野达2~3头时，立即喷药防治
	柑橘蚜虫	10%吡虫啉可湿性粉剂2500~3000倍液，4.5%高效氯氟菊酯乳油1500~3000倍液等	春夏秋梢抽发期，每隔10 d~15 d喷1次，连喷2~3次

病虫害种类		防治药剂种类及浓度	施药方法及时间
	柑橘潜叶蛾	20%吡虫啉可湿性粉剂2000~3000倍液, 25%除虫脲可湿性粉剂800~1000倍液等。	当夏梢、秋梢抽发1.0cm长时开始喷药, 每隔7d~10d喷1次, 连喷2~3次。
	蓟马类	20%吡虫啉可湿性粉剂3000~4000倍液, 20%甲氰菊酯乳油1000~2000倍液, 3%啉虫脲乳油2000倍液等。	花蕾期、幼果期及嫩梢期, 在低龄若虫盛发期前防治, 每隔10d~15d喷1次, 连喷2~3次。喷药时全株喷透, 如有间套种也要一起喷药防治。
	蚧类	24%螺虫乙酯悬浮剂2000~3000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液等。	在若虫1~2龄期喷药防治。矢尖蚧第一代若虫期为5月中、下旬, 是药剂防治重点时期。

